



बन्दा खेती पात्रो (Cabbage Cropping Calendar)

महिना	बैशाख	जेष्ठ	आषाढ	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र
हप्ता	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४
मौसम												



खेतको तयारी अवस्था



बेर्ना लगाइएको



गोड्मेल, मलखाद र सिंचाई व्यवस्थापन



दोस्रो मलखाद र सिंचाई व्यवस्थापन



बन्दाको तयारी अवस्था

बन्दा
नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षे भरि नै बन्दा खेती गर्न सकिन्छ। बन्दा खेती बलौटे देखि चिम्टाइलो सबै किसिमका माटोमा गर्न सकिन्छ। यसलाई ६.०-६.५ माटोको पि.एच. राम्रो मानिन्छ।

- जातहरू**
- **लेट लार्ज ड्रम** - यो बेर्ना सारेको ११५-१२० दिनमा तयार हुन्छ र सरदर उत्पादन १८००-२५०० के.जी. प्रति रोपनी हुन्छ।
 - **कोपेन हेगन मार्केट** - यो बेर्ना सारेको ७०-८० दिनमा तयार हुन्छ र सरदर १२००-१५०० के.जी. प्रति रोपनी उत्पादन हुन्छ।
 - **गोल्डेन एकर** - यो अगौटे जात भएकोले ६५-७५ दिनमा तयार हुन्छ र सरदर १०००-१२०० के.जी. प्रति रोपनी उत्पादन दिन्छ।
 - **प्राइड अफ इन्डिया** - यो बेर्ना सारेको ८०-८५ दिनमा तयार हुन्छ र सरदर १०००-१२०० के.जी. प्रति रोपनी उत्पादन दिन्छ।

यी जातहरू मुख्य मौसममा खेती गरिन्छ भने हाइब्रिड जातहरू बेमौसमी खेती गर्न असार देखि मंसिर सम्म उपयुक्त हुन्छ।

बीउ दर - १ रोपनीको लागि २०-३० ग्राम बीउ भए पुग्छ।
दूरी - अगौटे - ४० x ४० से.मी.
मध्यम र पछ्यौटे - ५० x ५० से.मी.
७५ x ३० से.मी.

बेर्ना सार्ने र बाली लिने समय

नेपालको भौगोलिक क्षेत्र अनुसार बन्दाको खेती सालभरि नै गर्न सकिने भएकोले तलको तालिका अनुसार यसलाई लगाउन सकिन्छ।



- कीराहरू**
- बन्दाको पुतली (Cabbage butterfly)**
- रोकथाम** - नुभान ७५ ई.सी. ६-७ एम.एल./१० लिटर पानीमा मिसाई छर्ने अथवा
- फेनफेन २० ई.सी. ५ एम.एल./१० लिटर पानीमा मिसाई छर्ने।
 - साइथायन ५० ई.सी. १० एम.एल./१० लिटर पानीमा मिसाई छर्ने।

- बन्दाको लाही**
- रोकथाम** - नुभान १ एम.एल./ १.५ लि. पानीमा वा रोगर ४० ई.सी. ५ एम.एल./४ लि. पानीमा मिसाई छर्ने।
- मारगोसन निमको भोल ३ एम.एल./ लि. पानीमा लाही देखिने वित्तिकै ७ दिनको फरकमा तीन पल्ट छर्ने।
 - ९ भाग पानीमा १ भाग जिवाड मिसाई २-२ दिनको फरकमा ५-६ पटक छर्दा लाही नियन्त्रण हुन्छ।
 - एक भाग गाईभैसीको गोत्रमा १० भाग पानी मिसाई लाही देखिनासाथ ३-४ दिनको फरकमा पूरै पात भिज्ने गरी ३ पटक छर्दा लाही नियन्त्रण हुन्छ।

- बन्दाका रोगहरू**
- जराको गाँठो रोग (Club root)** - यो रोग अम्लीय माटोमा लाग्ने दुसीजन्त्य रोग हो। दुसी जराभित्र पसेर गाँठो बनाई बोट कमजोर बनाउँछ।
- उपचार** - (१) माटोको पि.एच. मान ७.० - ७.३ हुने गरी चुनाको प्रयोग गर्नु पर्दछ।
(२) संजीवनी र चिनी १०० ग्रामका दरले २० लिटर पानीमा मिसाई सो भोल बनाएर व्याडको बेर्ना र माटो राम्ररी भिज्ने गरी छर्नु पर्दछ।

- बेर्ना कुहिने रोग (Damping off)** - यो दुसीबाट लाग्ने रोग हो। जमिनको सतह माथि दुसी बेर्नाको फेदमा पानीले भिजे जस्तो दाग देखिन्छ, बेर्ना ओइलाई ढल्ने र मर्ने गर्दछ।

- उपचार** - (१) फर्मािलिनले व्याडको उपचार गर्ने।
(२) डाइथेन एम-४५ वा थिरमको ०.२% भोल वा वेभिष्टिन ०.१% भोलले व्याडको उपचार गर्ने।

- पातको टुप्पा डह्ने** - बन्दाको पहिलो पातको टुप्पा र किनारको भाग हल्का खैरो देखिने र पछि कालो भएर जाने हुन्छ, यो क्याल्सियम तत्वको कमीले हुने गर्छ।

- उपचार** - क्याल्सियमको कमीले हुने भएकोले क्याल्सियम युक्त मल जग्गा तयारीको बेला प्रयोग गर्नु पर्दछ।

सन्दर्भ सामग्री
तरकारी खेती प्रविधि-२०६८, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्यांक महाशाखा, कृषि विकास मन्त्रालय, काठमाडौं।



भौगोलिक क्षेत्र	बेर्ना सार्ने समय	बाली लिने समय
उच्च पहाड	फाल्गुन-भाद्र	जेष्ठ-मंसिर
मध्य पहाड	सालभर	वर्षेभरि
खोच, बेसी, तराई	भाद्र-माघ	मंसिर-चैत्र