



नेपाल सरकार  
Government of Nepal

# कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agricultural Development

सिंहदरबार, काठमाण्डौ, नेपाल  
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal



Asian Food & Agriculture  
Cooperation Initiative

## सुन्तला जात फलफूल खेती पात्रो (Citrus Calendar)

सुन्तला जात फलफूल खेती		बैशाख	जेष्ठ	आषाढ	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र
हप्ता		१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४
मौसम													
सुन्तला जात फलफूल उत्पादन प्रविधि													
तयारीको अवस्था	बेनाको छनौट	उन्नत जातको बेना किन्ने ।											
	मुख्य जातहरू (जातीय छनौट)	कागती : तराईका लागि एन.सी.आर.पी.-४९, एन.सी.आर.पी.-५३, एन.सी.आर.पी.-५५, सुन्तला : धनकुटा स्थानीय, पोखरा स्थानीय, ओकित्सुवासे (मध्य पहाडको लागि) जुनार : स्थानीय, वासिङ्गटन नाभेल, भ्यालेन्सिया ।											
बिरुवा रोप्ने र स्याहार सुसारको अवस्था	वर्गैचा रेखाङ्कन र लगाउने दुरी	वर्गाकार □ वा षट्कोणाकार ○ वा गढा कान्ला तरीका । खाल्टोको दुरी सुन्तला: ५-६ मी. × ५-६ मी, जुनार: ६-७ मी. × ६-७ मी. र कागती: ४-५ मी. × ४-५ मी. गहिराई २ फिट र गोलाई ३ फिट भएको खाल्टो बिरुवा रोप्नु १-२ महिना अगावै खन्नुपर्छ । खाल्टोको भित्र भागमा सुकेको घाँस आदि मिसाएर र माथिल्लो भागमा पाकेको कम्पोष्ट वा गोबर मल, चुना, पिना आदि माटोमा मिसाएर पुर्नु पर्छ । खाल्टोको ढिस्को १ फिट जती अग्लो उठाउनुपर्छ ।	<b>कल्ले कीरा नियन्त्रण विधि:</b> यो कीरा बाक्लो कल्ताभित्र हुने भएकोले विषादी छरे पनि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ यो कीरा हिँड्ने (Crawling) अवस्थाको समय पत्ता लगाइ सर्वो वा एट्सो तेल १० देखि २० मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई राम्ररी बोट भिजे गरी १०/१२ दिनको फरकमा छर्न सके सम्पूर्ण कल्ले कीरा नियन्त्रण हुन्छ ।	<b>हरियो पतेरा नियन्त्रण विधि:</b> पतेरोको फूल र बच्चा अवस्था पहिचान गरी संकलन गर्ने र नष्ट पार्ने । बढी क्षति पार्ने अवस्था भएमा रोगर वा मालाथियन वा यस्तै प्रकारका बढी गन्ध आउने विषादीहरू १ मि. लि. प्रति लिटर पानीका दरले छर्ने । विषादीको गन्धले पतेरो भाग्छ । विषादीको गन्ध हराएपछि पतेरो फेरि आउँछ तसर्थ ८/१० दिनको फरकमा ३४ पटक छर्ने ।	<b>सिट्रस सिल्ला नियन्त्रण विधि:</b> सबैखाले चुसाहा कीरा नियन्त्रण गर्ने । खपटे कीराले सिट्रस सिल्ला कीराको शिकार गर्दछ । एकखालका मसिना वारुला (Tamarexia radiatus) ले परजीविको काम गर्दछ । यसले सिल्लाको शरीरभित्र फूल पार्दछ र बच्चा निस्क्रेपछि भित्री भाग खाई बाहिर निस्कन्छ ।	<b>फल कुहाउने भिगा कीरा नियन्त्रण विधि:</b> १. मालाथियन भोल १ एम.एल./लि. पानीमा १० ग्राम चिनी मिलाई छर्ने । २. एक किलोग्राम सख्खर पानीमा भिजाएर लेदो हुने गरी हल्का पकाउने र चिसो भएपछि १० एम.एल. मालाथियन वा रोगर मिलाएर राम्ररी फिटने । यसरी तयार पारेको विषादीलाई बोटको अलग अलग हाँगामा लेप दल्ने ।							
	बिरुवा रोप्ने समय र तरीका	सुन्तला जातको बिरुवा मुना फुट्नु अगाडी माघ-फाल्गुन पहिलो हप्ता वा अषाढ महिनामा रोप्न सकिन्छ । बिरुवा रोप्ने खाल्टोको विच भागमा रोपेर प्रशस्त पानी हाली बोटको वरीपरी छापरा राख्नु पर्दछ ।	<b>जरा कृहिन रोग नियन्त्रण विधि:</b> जरा कृहिनको बोटमा जुन भागतिर पात पहिलोको छ त्यही भागतिरको जरा खनेर कृहिनका जरा सिक्रेचरले काटेर हटाउने । कृहिनको जरा हटाईसके पछि सवे जरा लक्ष्म भिजे गरी १ प्रतिशतको बोडो मिश्रणले भिजाउने ।	<b>फेद कृहिन रोग नियन्त्रण विधि:</b> तिनपाते रुट-स्टकमा कलमी गरिएका बेनाहरू लगाउने । बोटको बेसिन तथा फेद वरिपरि ट्राईकोडर्मा हुसीको प्रयोग गर्ने सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष हिउँदमा फल टिपी काटिछाँट गरिसकेपछि बोडो-पेट बनाई फेदमा दल्ने ।	<b>गुँद निस्कने रोग (Gummosis) नियन्त्रण विधि:</b> नियमित रूपमा वर्गैचा व्यवस्थापन गर्ने र रोग लागेका हाँगारु काटेर जलाई दिने । वार्षिक कार्य तालीका अनुसार पुरै बोट लक्ष्म भिजे गरी बोडो मिश्रण छर्ने ।	<b>क्याङ्गर (कोत्रे रोग) नियन्त्रण विधि:</b> वर्षको २-३ पटक नियमित १ प्रतिशतको बोडो मिश्रण छर्ने । पात खन्ने कीरा लिफ माईनर नियन्त्रणको लागि विषादी प्रयोग गर्ने । रोग लागेका हाँगारु काटिछाँट गरी कासुगिमाईसिन (Kasu-B) २ एम.एल./लि. पानीमा मिलाएर छर्ने ।	<b>सिट्रस ग्रिनिङ नियन्त्रण विधि:</b> स्वस्थ बिरुवा लगाउने, सिट्रस सिल्ला नियन्त्रण गर्ने र रोगी बिरुवा नष्ट गर्ने ।						
	सिंचाई र व्यवस्था	माटोको १ मिटर गहिराई सम्म चिस्यान उपलब्ध हुनुपर्छ । फूल फुल्ने र फल लाग्ने अवस्थामा सिंचाई अत्यावश्यक पर्छ । तर कूलो बनाई अत्याधिक पानीको निकास गर्नुपर्छ ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने कीराहरूको जानकारी</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>							
	भारपात नियन्त्रण	हातले भारपात निकालेर गोडमेल गर्ने । तर भारपात उम्रेको खण्डमा जुनै बेला पनि गोडमेल गर्न सकिन्छ ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>							
	तालीम तथा काँटछाँट	एक वर्षको बिरुवा रोप्दा २५ से.मी. माथि र दुई वर्षको बिरुवा रोप्दा २-३ मूल हाँगा राख्नुपर्छ । रोग लागेको हाँगा वर्षेनी छाँटकाँट गरेर हटाउदा फल बढि दिन्छ ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>							
	मलखादको प्रयोग	फल लाग्ने प्रति बोट प्रति वर्ष: सुन्तला र जुनारमा : कम्पोष्ट मल २५ किलो, नाइट्रोजन, फसफोरस र पोटास ५००:३००:५०० ग्रामका दरले प्रयोग गर्ने । कागतीमा : कम्पोष्ट मल २५ किलो, डि.ए.पी-४३५ ग्राम, यूरीया - ७०० ग्राम, पोटास - ५५० ग्राम वर्षातको बेलामा हाल्नु राम्रो हुन्छ ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>							
किटनासक विषादीको प्रयोग	किराहरू देखिए मात्र प्रयोग गर्ने ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>								
रोगको व्यवस्थापन	समय समयमा काँटछाँट गर्ने (रोगको मात्रा कम हुन्छ र फल पनि अत्याधिक लाग्छ) ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>								
फूलको समय	फाल्गुन चैत्र (MARCH -APRIL) का बेला फूल फुल्दछन् ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>								
फूल खस्ने र कम फल लाग्ने समस्या	अत्याधिक पानी वा सुख्खा भएमा, राम्रो उन्नत बेनाको छनौट नभएमा, हिउँ परेमा समस्याको निवारण २,४ - डी १०-१५ पी.पी.एम. फूल फुल्ने र फल लागेपछि छर्ने ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>								
फल पाक्ने समय	फूल फुलेको २३५-२७० दिनमा पाक्छ ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>								
फल टिप्ने अवस्था	फल हरियोबाट पहेंलो रङ्गको हुन्छ र २ एम.एम. हाँगामा राखेर कैचीले काट्ने ।	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोगहरू</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>	<b>सुन्तला जात फलफूलमा लाग्ने रोग तथा किरा</b>								