



नेपाल सरकार  
Government of Nepal

# कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल  
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal



## एकीकृत बाली पात्रो - प्याज खेती (Integrated Crop Calendar- Onion)

महिना	बैशाख	जेष्ठ	अषाढ	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसिर	पुष	माघ	फाल्गुण	चैत्र
हप्ता	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४
मौसम												



गाना तयार भएको संकेत



प्याजका गानाहरु



बेर्ना बेड तयारी



प्याज लगाइएको खेत

प्याज गाना हुने विरुवा हो र यसलाई हरियो अवस्थामा वा सुकेको गाना तरकारी वा खानाका विभिन्न परिकारमा प्रयोग गरिन्छ।

**हावापानी :** प्याज खेती गर्ने ठाउँ बिहानैदेखि घाम लाग्ने पारिलो हुनुपर्छ। प्याजको बोट बृद्धि १३ डि. से. देखि २४ डि. से. तापक्रममा राम्रो हुन्छ।

**माटो :** मलिलो, पानीको राम्रो निकास भएको, हलुका दोमट माटोको पी.एच.मान ६.० देखि ६.८ सम्म हुनुपर्दछ।

**जातहरु :** १) नसिक ५३ २) रेड क्रियोल ३) सुपरेकस ४) टी.आई. १७२ ५) कास ६) भेनस ७) विन्टर सिल्बर

**खेती गर्ने तरिका :** प्याजको तीन प्रकारले खेती गरिन्छ।

- १) सोभै पातलो बीउ छरेर
- २) बेर्ना उमाने तथा उचित दूरीमा बेर्ना सरेर तथा
- ३) पहिले प्याजका साना दानाको सेट तयार गरी उक्त सेटबाट प्याजको खेती गर्ने।

**बाली लगाउने समय :**

- उच्च पहाडी क्षेत्रमा फागुन-चैत्र महिनामा बीउ छर्ने तथा बैशाख-जेठ महिनामा बेर्ना सारी वर्षमा एकपटक मात्र खेती गरिन्छ।
- मध्य पहाडी क्षेत्र, बेसी तथा तराई क्षेत्रमा असोज-कार्तिक महिनामा बीउ छर्ने तथा मंसिर-पौष महिनामा बेर्ना सारी खेती शुरु गरिन्छ तथा जेष्ठ महिनामा बाली तयार हुन्छ।

**जग्गाको तयारी :** प्याज खेतीको लागि डयाङ्ग बनाउँदा १ मिटर चौडाइ तथा आवश्यकतानुसारको (साधारणतया ३ मिटर) लम्बाई भएको हुनुपर्छ। दुई डयाङ्गको बीचमा करिब ८ इन्च जतिको खाली ठाउँ राख्नुपर्छ।

मलखाद प्रांगारिक तथा रासायनिक मलखादहरु (युरिया तथा हर्मोनहरु बाहेक) जमिन तयार गर्ने समयमा प्रति रोपनीका दरले प्रयोग गर्नु पर्छ :

- प्रांगारिक र गोबर मल - करिब २ टन
- पिना - २० के. जी.
- डी. ए. पी. - १५ के. जी.
- युरिया - १० के. जी. (टप ड्रेसिंगका लागि)
- म्युरेट ओफ पोटास - १० के. जी.
- जिङ्ग सल्फेट - १ के. जी.
- बोरेकस - १ के. जी.
- बायोजाम - १ के. जी.
- हर्मोनहरु - प्राविधिकको सल्लाह बमोजिम

**बीउ दर :** ५००-६०० ग्राम बीउ प्रति रोपनी।

बेर्ना उत्पादन स्गुणस्तरीय उच्च उमार शक्ति भएको बीउ छान्नुपर्दछ। प्याजको जात हेरी बोटदेखि बोटको दूरी १० से. मि. तथा हार देखि हारको दूरी १५ से. मि. भएमा एक रोपनी क्षेत्रफलमा करिब २५००० देखि ३०००० प्याजको विरुवा आवश्यक पर्दछ। एक रोपनी क्षेत्रफल ढाक्नका लागि करिब १० वर्ग मिटर क्षेत्रफलको ब्याडको आवश्यकता पर्दछ। प्याजको नर्सरी पारिलो ठाउँमा राख्नुपर्छ।

**बेर्ना सार्ने :** प्याजको बीउ छरेको एक महिनामा गर्मी महिनामा तथा २ महिनामा जाडो महिनामा बेर्ना सार्न लायक हुन्छ। दहा, मोटा तथा स्वस्थ विरुवा मात्र छनोट गरी रोप्नुपर्छ। प्याजको बेर्ना उखेल्नुभन्दा १-२ दिन

अघि नै क्रिनोक्सिल गोल्ड नामक दुसीनाशक बिषादी २ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई ब्याडमा माटो समेत भिज्ने गरी छर्नुपर्छ। रोपका लागि छानिएको बेर्नाको जरालाई रोप्नुभन्दा पहिले एच. बी. १०१ दुई थोपा वा एटोनिक दुई थोपा प्रति लिटर पानीमा आधा घण्टासम्म उपचार गरेपछि मात्र रोप्नुपर्छ। बेर्ना रोपिसके पछि नसरुन्जेलसम्म माटोको चिस्यान हेरी आवश्यकतानुसार दिनको दुई पटक ५ दिनसम्म पानी हाल्नुपर्छ।



**बिषादीको प्रयोग :**

जग्गाको तयारी गर्दाको समयमा हालिएको मलखाद बाहेक विरुवा राम्ररी सरेपछि पहिलो पटक ३० देखि ४० दिनभित्र मल्टिप्लेक्स वा जीङ्गोप्लेक्स वा एग्रोमिन २ एम. एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाई १५/१५ दिनको फरकमा ४ पटक छर्नुपर्छ।

विरुवालाई रोग तथा किराबाट बचाउन तथा राम्ररी हुर्काउन वेभिस्टिन २ ग्राम र रोगर १ एम. एल. प्रति लिटर पानीका दरले बेर्ना तथा माटो समेत राम्ररी भिज्ने गरी छर्नुपर्छ।

**टप ड्रेसिंग :** ५ किलो युरिया बेर्ना रोपेको २० देखि २५ दिनमा र दोश्रो ५ किलो युरिया बेर्ना रोपेको ४० देखि ४५ दिनभित्र लाइनमा छरी टप ड्रेसिंग गर्नुपर्छ। टप ड्रेसिंग गर्दा दुई हारको बिचमा ५ से. मि. गहिरो कुलेसो बनाई युरिया राखी माटोले पुरी सिचाई दिनुपर्छ। त्यस्तै १ भाग जिवातु भोल मलमा ३ भाग पानी मिसाई साताको दुई पटक ३-४ महिनासम्म बोट तथा जरा भिज्ने गरी छर्दा धेरै राम्रो हुन्छ।

**गोडमेल :** साधारणतया ३ देखि ५ पटक भारपात उखेल्नुपर्छ।

**सिचाई :** प्याज रोपेको आधा जीवन चक्रसम्म प्रशस्त चिस्यानको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि पानीको मात्रा कम गर्दै लैजानु पर्दछ र अन्त्यमा (थन्क्याउने बेला) सुख्खा राख्नुपर्दछ। प्याजलाई सुरुको २,३ महिना प्रशस्त मात्रामा चिस्यानको आवश्यकता पर्दछ जसका लागि उचित सिचाईको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।

**किराहरु :** थ्रिप्ले आक्रमण गरेमा पातमा सेतो तथा हल्का पहेलो धब्बाहरु देखिन्छन् तथा पात केहि खुम्चने टुप्पा खैरो हुने तथा मर्ने हुन्छन्। यस बाहेक प्याजमा उफ्रने, खप्ते, लाही, सुलसुले आदिले पनि दुःख दिन्छन्। प्याजका सम्पूर्ण किरा तथा सुलसुले नियन्त्रण गर्न मलाथियन, रोगर, थयोडान, नुभान आदि कुनै पनि एक किटनाशक बिषादी २ एम. एल. प्रति लिटर



पानीका दरले ७ - ७ दिनको फरकमा २-३ पटक छरेमा सजिलैसंग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यसैगरी प्रांगारिक तवरबाट कीरा नियन्त्रण गर्न शुरुदेखि नै निरन्तर रूपमा १ भाग जिवातु भोल मलमा ३ भाग पानी मिसाई साताको २ पटक ३-४ महिनासम्म बोट तथा जरा भिज्ने गरी छर्दा पनि कीराको आक्रमण कम गर्न सकिन्छ।

**रोगहरु :** बैजनी धब्बा, कालो पोके, डाउन मिड्यु, डडुवा आदि प्याजमा लाग्ने मुख्य रोगहरु हुन् भने एन्थ्रकनोज बैजनी जरा फेद कुहिने आदि रोगहरुले पनि प्याजमा आक्रमण गर्दछन्।



**बाली तयारी :** प्याज रोपेको १३० देखि १५० दिनमा दोस्रो गानोका रूपमा बाली तयार हुन्छ। हरियो प्याजका रूपमा ११० देखि १२० दिनमा तयार हुन्छ। प्याजको सेट रोपेको ६० देखि ७० दिनभित्र गानु उखेल्न सकिन्छ।

**प्याजका रोगहरुबाट सजिलैसंग छुटकारा पाउन निम्न कार्य गर्नुपर्छ :**


- अन्नबालीसंग घुम्टि बाली लगाउने। रोगमुक्त स्वस्थ बीउ रोप्ने र खेतबारी सफा राख्ने।
- थिराम वा क्याप्टान ३ ग्राम प्रतिकिलो बीउका दरले प्याजको बीउ छर्नुभन्दा पहिले उपचार गर्ने।
- नर्सरीमा १ लिटर फर्मलडिहाईड (४०%) ६० लिटर पानीमा हाली एक लिटर प्रति वर्गमिटर माटो भिज्ने गरी माटोको उपचार गर्ने।
- डाइथेन एम-४५, क्याप्टान, वेभिस्टिन वा क्रिनोक्सिल गोल्ड २ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई ७ देखि १० दिनको फरकमा ३ पटक छर्ने।

**बाली थन्क्याउने :** हरियो तरकारीका लागि खेती गरिएको प्याज कलिलो अवस्थामा नै उखेलिन्छ। हरियो प्याज बेर्ना रोपेको ३-५ महिनामा तयार हुन्छ। गाना तयार भएको संकेत डाँठहरु भन्चिएर भुइमा हुन्छन् र पातहरु पहेला हुन्छन्। गाना निकालेपछि ३ दिन छायामा सुकाउनु पर्दछ। प्याज थन्क्याउने बेलामा मौसम न्यानो र सुख्खा हुनुपर्दछ।



**प्याजको उत्पादन :** प्याजको जात हेरी उन्नत तरिकाबाट खेती गरिएमा १५०० - २००० किलोग्रामसम्म प्रति रोपनी उत्पादन हुन्छ।

**प्याज सुकाउने (curing) :** प्याज खन्ने बितिकै केही दिनसम्म हावादार, छाँयादार तथा सुख्खा स्थानमा



सुकाइन्छ। ३ देखि ४ साता भित्र प्याज राम्ररी क्यूरिङ्ग भइसक्छ।

**भण्डारण :** प्याजलाई भण्डारण गर्न शून्य डि. से. तापक्रम तथा ६० देखि ६५ प्रतिशत आर्द्रता उपयुक्त हुन्छ।

**सन्दर्भ सामग्री :**

- (१) तरकारी खेती प्रविधि (Vegetable Farming technology), चैत्र-२०६८, नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय तथा तथ्यांक महाशाखा, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
- (२) प्याज खेती तथा बिउ उत्पादन प्रविधि (Onion Cultivation & Seed Production Technology), भाद्र २०७०, नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा तथ्यांक महाशाखा, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल।
- (३) हाम्रो सम्पदा राष्ट्रिय मासिक (Hamro Sampada National Monthly), मसलाबाली विशेषांक, वर्ष-१५, अंक-६, २०७२ साल कार्तिक।